

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)



ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY

- Karmienie, pojenie, utrzymywanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przechowywanie paszy, materiału wykorzystywanego do ścielenia, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- przed i po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu (nie używanie tej samej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego do czynności związanych z obsługą drobiu poza miejscem utrzymywania drobiu);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRODUCENTÓW DROBIU

- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu;
- karmienie, pojenie, utrzymywanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przechowywanie paszy, materiału wykorzystywanego do ścielenia, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- nie wykorzystywanie zielonki stosowanej w karmieniu drobiu wodnego (np. kaczki i gęsi) pochodzącej z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (np. z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich);
- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt, w których utrzymywany jest drób;
- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- dezynfekcja pojazdów wjeżdżających;
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu (nie używanie tej samej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego do czynności związanych z obsługą drobiu poza miejscem utrzymywania drobiu);
- dokładne mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

- dokładne mycie i dezynfekcja sprzętu, narzędzi wykorzystywanych w hodowli drobiu przed każdym ich użyciem;
- brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.
- regularne przeglądy wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);